

PROYECTO HORTICOLA PROVINCIAL 2002

CULTIVO: PEREJIL (*Petroselinum crispum* Mill.)

1. CICLO DE CULTIVO EN DÍAS : 70 -80

2. CANTIDAD DE CULTIVOS AL AÑO: 5 - 6

3. CALENDARIO DE SIEMBRA Y COSECHA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Siembras												
Cosecha												

Producción de Primavera - verano: Valles de altura, superior 800 msnm.

Producción de Otoño – invierno: Valle Central de Catamarca, zonas de pedemonte...

4. VARIEDADES

Común
Gigante

5. MANEJO DEL CULTIVO

Preparación del suelo. Las secuencias de labores indicadas son: 1° cincel, 2° melgas, 3° riego de pre - plantación, 4° rastrado, 5° Surcado - platabandas, 6° Siembra directa , 8° herbicida preemergente.

El marco de plantación es de 0,7 m entre surcos y a doble hilera. Es necesario 6 a 10 kg / ha. La siembra se realiza con sembradora tipo planet.

Cuadro síntesis de manejo de cultivo.

Labor	Indicación	Recomendación
Riegos	Por surco, frecuencia media de 7 días	Momentos críticos: germinación. Abundante agua en todo el ciclo
Fertilización	Estiércol maduro. Cama de pollo barrillero, de vacuno y caprino. 15 ton / año.	El estiércol tiene que estar "maduro" y se lo debe aplicar con 30 días de antelación. Urea: 100 Kg. /ha. 2 aportes
Malezas	Carpidas y aporques mecánicos.	Herbicidas: Prometrina 1 a 1.5 li /ha. ó linuron 1,5 li /ha / 400 litros de agua.
Enfermedades	Septoria	Rotación. Semilla de calidad. Benomil, Ridomil.

Programa de promoción de las actividades Agrícolas Intensiva en la provincia de Catamarca. Agregado de Valor y Comercialización de Productos Hortícola

6. COSECHA Y POST-COSECHA

La misma se realiza en forma manual cuando los tallos alcancen 10 cm de altura practicándose varios cortes por cultivo.

7. COMERCIALIZACIÓN

Se realiza el embalaje de cajones tipo toritos de 10 kg de capacidad. Normalmente se disponen atados de una mano comercializándose por docenas y por cientos. Los canales de comercialización son: Institucional, supermercados, mercados concentradores locales ó nacionales, ferias municipales y puestos móviles.

8. OBSERVACIONES

Las siembras pueden ser escalonadas semanalmente ó quincenalmente. No existen problemas sanitarios significativos.