

PROYECTO HORTICOLA PROVINCIAL 2002

CULTIVO: ACHICORIA (*Cichorium intybus*.)

1. CICLO DE CULTIVO EN DÍAS : 60 - 80

2. CANTIDAD DE CULTIVOS AL AÑO: 6

3. CALENDARIO DE SIEMBRA Y COSECHA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
Siembras	Valle Altura		Normal									Valle de Altura	
Cosecha													

Producción de Primavera - Verano: Valles de altura, superior 800 - 1000 msnm

Producción de Otoño – Invierno: Zona de producción tradicionales.

4. VARIEDADES

Catalogna.

5. MANEJO DEL CULTIVO

Preparación del suelo. Las secuencias de labores indicadas son: 1° cincel, 2° melgas, 3° riego de pre - plantación, 4° rastrado, 5° Surcado, 6° Siembra directa ó transplante, 7° riego de ajuste.

Se implanta en surcos a 0,7 m entre si y con siembra a chorrillo para su posterior raleo a 10 cm. Es necesario 5 Kg. de semilla por ha.

Cuadro síntesis de manejo de cultivo.

Labor	Indicación	Recomendación
Riegos	Por surco, frecuencia media de 4 días	Momentos críticos: germinación
Fertilización	Estiércol maduro. Cama de pollo barrillero, de vacuno y caprino. 15 ton / año	El estiércol tiene que estar "maduro" y se lo debe aplicar con 30 días de antelación.
Malezas	Carpidas y aporques mecánicos. Manual entre planta	Herbicidas: Dual, 2 litro / 400 litros de agua. – treflan, 1, 1 litro /ha preemergente incorporado.
Enfermedades	Virosis. Marchitamientos.	Control de plagas- Calidad de semillas. Rotación. Vinclozolin.
Plagas	Pulgones, Trips y Chinchas.	Aficida Duperial, Decis.

Programa de promoción de las actividades Agrícolas Intensiva en la provincia de Catamarca. Agregado de Valor y Comercialización de Productos Hortícola

6. COSECHA Y POST-COSECHA

La misma se realiza cuando adquieren un tamaño comercial entre 45 a 60 cm. La cosecha es manual, y se corta la planta al ras del suelo, eliminando hojas externas sucias ó deterioradas. Es conveniente el lavado de las plantas, para que hidrate las hojas y por otro lado mejore su presentación. La temperatura de conservación puede situarse debajo de los 5 ° C. Método de enfriamiento: Vaccun y Hidrocooler.
Se puede obtener rendimiento de entre 30.000 Kg. por ha.

7. COMERCIALIZACIÓN

Se comercializa la planta entera, presentadas en cajones ó jaulas de 10 a 16 Kg. Los canales de comercialización son: Institucional, supermercados, mercados concentradores locales ó nacionales, ferias municipales y puestos móviles.

8. OBSERVACIONES

La práctica sobre la producción de Achicoria indica que la misma debe hacerse mediante siembras escalonadas semanalmente. Por otra parte se recomienda el empleo de variedades resistente al calor para las siembras de verano. Estas siembras realizarla en lugares fresco, siendo muy recomendable los valles de altura superiores a 800 msnm.