

PROYECTO HORTICOLA PROVINCIAL 2002

CULTIVO: REMOLACHA (*Beta vulgaris L. var. esculenta.*)

1. CICLO DE CULTIVO EN DÍAS : 70 - 90

2. CANTIDAD DE CULTIVOS AL AÑO: 5

3. CALENDARIO DE SIEMBRA Y COSECHA

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Siembras	Valle Altura										Valle de Altura	
Cosecha												

Producción de Primavera - Verano: Valles de altura, superior 800 msnm .

Producción de Otoño – Invierno: Valle Central de Catamarca, zonas de pedemonte..

4. VARIEDADES

Del País – variedad –

Detroit – variedad -verano – otoño

Se recomienda

Siembra de otoño – invierno: Variedades Importadas. (por resistencia a la floración)

Siembra de primavera - verano: Variedades Nacionales (por mejor adaptación)

5. MANEJO DEL CULTIVO

Preparación del suelo. Las secuencias de labores indicadas son: 1° cincel, 2° melgas, 3° riego de pre - plantación, 4° rastrado, 5° Surcado, 6° Siembra directa, 7° herbicida preemergente.

El marco de plantación es de 0.5 a 0,7 m entre surcos y siembra directa a chorrillo continuo con un requerimiento de entre 7 a 10 kg. / ha. Luego debe realizarse el raleo y desmate.

Cuadro síntesis de manejo de cultivo.

Labor	Indicación	Recomendación
Riegos	Por surco, frecuencia media de 4 días	Momentos críticos: germinación ó transplante. Abundante agua en todo el ciclo
Fertilización	Estiércol maduro. Cama de pollo barrillero, de vacuno y caprino. 15 ton / año	El estiércol tiene que estar "maduro" y se lo debe aplicar con 30 días de antelación.
Malezas	Carpidas y aporques mecánicos. Manual entre planta	Herbicidas: Dual, 2 litro / 400 litros de agua. – treflan, 1, 1 litro /ha preemergente incorporado. Pyramin: 5 litro /ha
Enfermedades	Viruelas. Virosis.	Calidad de semillas. Rotación. Ridomil- Oxiclورو de cobre
Plagas	Orugas, Minadores de hojas.	Dipel Plus, Decis,

Programa de promoción de las actividades Agrícolas Intensiva en la provincia de Catamarca. Agregado de Valor y Comercialización de Productos Hortícola

PROYECTO HORTICOLA PROVINCIAL 2002

6. COSECHA Y POST-COSECHA

La misma se realiza cuando las raíces alcanza un diámetro de 4 a 8 cm. Se cosecha planta entera (Raíz y Hojas) preparando manojos de 1,5 kg. A 1 ° C y 90 % de H.R se puede almacenar hasta 15 días
Es posible rendimiento de 25 a 30 ton. / ha.

7. COMERCIALIZACIÓN

Se comercializa en manojo ó atados de un mano y colocado en cajón tipo jaula ó toritos de 25 a 15 kg. respectivamente. El peso promedio por atado es de 1.5 kg. Los canales de comercialización son: Institucional, supermercados, mercados concentradores locales ó nacionales, ferias municipales y puestos móviles.

8. OBSERVACIONES

Se recomienda el empleo de variedades resistente al calor para las siembras de verano. Estas siembras realizarla en lugares fresco, siendo muy recomendable los valles de altura superiores a 800 msnm.